

**FARMTROBIN 250** ialah racun kulat daripada kumpulan “methoxyacylate” yang bertindak secara sistematik.

**ATURAN PENGGUNAAN:**

**Penggunaan tidak mengikut label adalah satu kesalahan di bawah Akta Racun Makhluk Perosak 1974.**

TANAMAN	PENYAKIT	KADAR RACUN		ISI PADU SEMBURAN SEHEKTAR
		10 Liter Air	Sehektar	
Cili	Reput Buah ( <i>Colletotrichum capsica</i> )	5 ml	500 ml	1000 liter
Kekwa	Karat Putih ( <i>Puccinia horiana</i> )			
Tomato	Hawar Seludang ( <i>Alternaria solani</i> )			
Timun	Kulapuk Downy ( <i>Pseudoperonospora cubensis</i> ) Kulapuk Berdebu ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> )			
Manga	Reput Buah / Hawar Bnga / Antraknos ( <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> )	5 ml	500 ml	
Padi	Hawar Seludang ( <i>Rhizoctonia solani</i> ) Karat ( <i>Pyricularia oryzae</i> )	13 ml	250 ml	250 liter

Jangan kutip hasil tanaman cili, tomato dan timun sekurang-kurangnya 3 hari selepas semburan Terakhir, 7 hari bagi manga dan 14 hari bagi padi.