

BUKA SINI UNTUK
KETERANGAN LANJUT



Basta 15

Bahan Aktif: glufosinate ammonium...13.5% w/w
(glufosinate ammonium.....150 gm/l)
Bahan Lengai:.....86.5% w/w

Kandungan Bersih:
4 liter

RACUN RUMPAI

LARUTAN BERAIR

No. Pendaftaran: LRMP. R1/2826

Didaftarkan oleh:
Bayer CropScience
(Malaysia) Sdn Bhd (7563 M)
12th Floor, Wisma Damansara,
Jalan Semantan, 50490 Kuala Lumpur.
Tel: 03-2723 088



Jenis Rumpai Yang Dikawal / 有效控制以下之杂草:



Rumput kerbau / 牛吃草
(*Paspalum conjugatum*)



Rumput pait / 竹稷草
(*Ottochloa nodosa*)



Rumput sambau / 大头草
(*Eleusine indica*)



Akar ruas-ruas / 白花草
(*Asystasia intrusa*)



Lidah jin / 白花木草
(*Hedyotis verticillata*)



Rumput parit / 地毡草
(*Axonopus compressus*)



Ceroma / 猪藤草
(*Mikania micrantha*)



Rumput setawar / 小鸡草
(*Borreria latifolia*)



Kekacang penutup bumi/
覆土豆藤
(*Calapogonium caeruleum*)



Jabung / 蒲公英
(*Erigeron sumatrensis*)



Senduduk / 黑牡丹草
(*Melastoma malabathricum*)

Panduan Membancuh: Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan Basta 15 secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukatan dan bancuh. Jangan guna pada kadar yang lebih tinggi. Seterusnya tambah baki air bersih yang diperlukan dan kacau. Jangan simpan Basta 15 di dalam tangki alat penyembur.

Panduan Menyembur: Disyorkan mengguna alat penyembur gelas bernozel fanjet saiz 5/64" atau low volume spray nozzle atau Penyembur CDA. Ketika menyembur, elakkan kabus semburan daripada terkena pada tanaman lain kerana kerosakan teruk atau kebinasaan mungkin berlaku. Jangan guna ke atas kawasan tanaman lain yang tidak disyorkan. Basuh tangan dan alat penyembur sebersih-bersihnya selepas menggunakannya.

Tempoh Dilarang Masuk Semula Kawasan Rawatan (REI) : 12 jam

Sila baca dan patuhi arahan label.



BERBAHAYA
JAUHKAN DARIPADA
MAKANAN DAN KANAK-KANAK

KELAS III

HARMFUL
KEEP AWAY FROM
FOODSTUFF AND CHILDREN

有害品
勿貯藏在靠近食品或
兒童所接觸的地方

BERBAHAYA
JAUHKAN DARIPADA
MAKANAN DAN KANAK-KANAK

KELAS III

HARMFUL
KEEP AWAY FROM
FOODSTUFF AND CHILDREN

தீங்கழைப்பது
உணவுகள் மற்றும் குழந்தை
களுக்கு அருகில் வைக்காதீர்

ATURAN MENGGUNAKANNYA:

Jenis Rumpai yang dikawal	Kawasan Tanaman	Peringkat Tanaman	Alat Semburan	Jenis Muncung	Kadar Racun		Isipadu Semburan Sehektar
					10 liter air	sehektar	
Rumput kerbau (<i>Paspalum conjugatum</i>) Rumput pait (<i>Ottochloa nodosa</i>) Rumput sambau (<i>Eleusine indica</i>) Rumput parit (<i>Axonopus compressus</i>) Akar ruas-ruas (<i>Asystasia intrusa</i>)	Getah, Kelapa sawit, Koko, Teh dan Kopi	Kurang daripada 30% naungan	Penyembur gelas	Fanjet saiz 5/64"	74 ml	3.3 liter	450 liter
				Low volume spray nozzle	330 ml		100 liter
		Lebih daripada 30% naungan	Penyembur gelas	Fanjet saiz 5/64"	44 ml	2.0 liter	450 liter
				Low volume spray nozzle	200 ml		100 liter
			Penyembur CDA	-	800 ml		25 liter
Lidah jin (<i>Hedyotis verticillata</i>) Ceroma (<i>Mikania micrantha</i>) Rumput setawar (<i>Borreria latifolia</i>)	Pisang, Gajus, Limau, Durian, Jambu batu, Mangga, Nangka, Betik dan Belimbing	Semua peringkat	Penyembur gelas	Fanjet saiz 5/64"	74 ml	3.3 liter	450 liter
Jabung (<i>Erigeron sumatrensis</i>) Senduduk (<i>Melastoma malabathricum</i>) Kekacang penutup bumi (<i>Calapogonium caeruleum</i>)	Kubis, Kubis cina, Sawi, Kailan, Salad, Tembikai, Tembikai susu, Timun, Tomato, cili, terung, Kacang panjang, Kacang buncis dan Kacang manis	Penyediaan tanah dan semburan antara barisan pada peringkat tumbesaran yang awal sahaja	Penyembur gelas	Fanjet saiz 5/64"	74 ml	3.3 liter	450 liter

Jangan kutip hasil tanaman sekurang-kurangnya 14 hari selepas semburan terakhir bagi kelapa sawit, koko, pisang, gajus, limau, durian, jambu batu, mangga, nangka, betik dan belimbing; 20 hari bagi kopi dan 7 hari bagi teh.

一般使用法:

控制之杂草	农作物	农作物 成长阶段	喷射器具	喷嘴量度	用药量		每公顷 喷液量
					10 公升水	每公顷	
牛吃草 (<i>Paspalum conjugatum</i>) 竹稷草 (<i>Ottochloa nodosa</i>) 大头草 (<i>Eleusine indica</i>) 地毡草 (<i>Axonopus compressus</i>)	胶树, 油棕, 可可, 茶树 及咖啡	少过 30% 树荫程度	背负式 喷射器具	5/64" 喷嘴量度	74 毫升	3.3 公升	450 公升
				低容量 喷嘴	330 毫升		100 公升
		超过 30% 树荫程度	背负式 喷射器具	5/64" 喷嘴量度	44 毫升	2.0 公升	450 公升
				低容量 喷嘴	200 毫升		100 公升
			CDA 喷射器具	-	800 毫升		25 公升
白花草 (<i>Asystasia intrusa</i>) 白花木草 (<i>Hedyotis verticillata</i>) 猪藤草 (<i>Mikania micrantha</i>) 小鸡草 (<i>Borreria latifolia</i>) 蒲公英 (<i>Erigeron sumatrensis</i>)	香蕉, 腰豆树, 柑桔树, 榴莲, 番石榴, 芒果, 波罗蜜, 木瓜 及杨桃	一切树荫程度	背负式 喷射器具	5/64" 喷嘴量度	74 毫升	3.3 公升	450 公升
黑牡丹草 (<i>Melastoma malabathricum</i>) 覆土豆藤 (<i>Calapogonium caeruleum</i>)	包菜, 白菜, 菜心, 芥兰, 生菜, 西瓜, 蜜瓜, 黄瓜, 番茄, 辣椒, 茄子, 菜豆, 龟豆及甜豆	在栽种前或 在初生长的 菜圃中间喷射	背负式 喷射器具	5/64" 喷嘴量度	74 毫升	3.3 公升	450 公升

最后一次喷射此药剂后, 至少 14 天内不可采收油棕、可可、香蕉、腰豆、柑桔类、榴莲、番石榴、芒果、波罗蜜、木瓜及杨桃、咖啡 20 天及茶叶 7 天。

有害品
勿貯藏在靠近食品或
兒童所接觸的地方

BERBAHAYA
JAUHKAN DARIPADA
MAKANAN DAN KANAK-KANAK

KELAS III

HARMFUL
KEEP AWAY FROM
FOODSTUFF AND CHILDREN

தீங்கழைப்பது
உணவுகள் மற்றும் குழந்தை
களுக்கு அருகில் வைக்காதீர்

AWAS: Berbahaya jika terminum. Elakkan daripada terhidu wasap atau kabus semburan. Elakkan daripada terkena pada kulit atau mata. Ketika mengendalikan produk ini, pakai pakaian pelindung diri termasuk sarung tangan dan pelindung muka serta JANGAN makan, minum atau merokok. Selepas mengendalikan racun ini, basuh badan sebersih-bersihnya dengan sabun dan air. Tutup bekas dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Cuci alat penyembur sebersih-bersihnya selepas menggunakannya. Jangan cemarkan kolam, sungai atau saliran air.

TANDA TERKENA RACUN: Sakit kepala, lemah, mual, hilang selera makan, muntah dan cirit-birit.

RAWATAN KECEMASAN: Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata, bersihkan dengan menggunakan air bersih yang banyak. Jika tertelan, jangan beri apa-apa melalui mulut dan jangan ikhtiarkan pesakit itu muntah. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

RAWATAN PERUBATAN: Rawatan hendaklah mengikut tanda sakit. Jika tertelan dan pesakit itu tidak muntah, kurasan gaster perlu dilakukan. Suntikkan 'phenobarbital sodium' ke dalam rongga tubuh.

MEDICAL TREATMENT: Treatment is symptomatic. If swallowed and patient is not vomiting, gastric lavage should be performed. Inject phenobarbital sodium intraperitoneally.

JAMINAN: Kami bertanggungjawab di atas mutu kandungan keluaran ini.

**JIKA BERLAKU KECEMASAN. HUBUNGI PUSAT RACUN NEGARA -
Freephone (1-800-88-8099)**

**JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN.
TANAM BEKAS RACUN APABILA KOSONG.**

RACUN RUMPAI
LARUTAN BERAIR
No. Pendaftaran: LRMP. R1/2826

Didaftarkan oleh:
Bayer CropScience
(Malaysia) Sdn Bhd (7563 M)
12th Floor, Wisma Damansara,
Jalan Semantan, 50490 Kuala Lumpur.
Tel: 03-2723 0888

Bahan Aktif: glufosinate ammonium.....13.5% w/w (glufosinate ammonium.....150 gm/l)
Bahan Lengai:.....86.5% w/w



Bayer CropScience

**BERBAHAYA
JAUHKAN DARIPADA
MAKANAN DAN KANAK-KANAK**

KELAS III

**HARMFUL
KEEP AWAY FROM
FOODSTUFF AND CHILDREN**