

AWAS: Berbahaya jika terminum. Elakkan daripada terhidu wasap atau kabus semburan. Elakkan daripada terkena pada kulit atau mata. Pakai pakaian pelindung diri termasuk sarung tangan, dan JANGAN makan, minum atau merokok ketika mengendalikan produk ini. Basuh badan sebersih-bersihnya dengan sabun dan air selepas mengendalikan racun ini. Tutup bekas dengan rapat dan simpan di tempat berkunci yang mempunyai peredaran udara yang baik, kering dan dingin. Cuci alat penyembur sebersih-bersihnya selepas menggunakannya.

Produk ini adalah berbahaya pada ikan. JANGAN cemarkan kolam, sungai atau saliran air.

JIKA BERLAKU KECEMASAN. HUBUNGI PUSAT RACUN NEGARA - Freephone (1-800-88-8099)

JANGAN GUNAKAN BEKAS RACUN UNTUK MENYIMPAN MAKANAN. TANAM BEKAS RACUN APABILA KOSONG.

RACUN KULAT
EMULSI (EW)

No. Pendaftaran: LRMP. R1/6509

Bahan Aktif: tebuconazole...25.9% w/w
Bahan Lengai:.....74.1% w/w

Didaftarkan oleh:

Bayer CropScience
(Malaysia) Sdn Bhd (7563 M)
12th Floor, Wisma Damansara,
Jalan Semantan,
50490 Kuala Lumpur.
Tel: 03-2723 0888



Bayer CropScience

有毒品

POISONOUS
KEEP AWAY FROM
FOODSTUFF AND
CHILDREN

நஞ்சு

勿貯藏在靠近食品或
兒童所接觸的地方

உணவுகள் மற்றும் குழந்தை
களுக்கு அருகில் வைக்காதிர்



Folicur®

Bahan Aktif: tebuconazole...25.9% w/w
Bahan Lengai:.....74.1% w/w

Kandungan Bersih:

500 ml

RACUN KULAT
EMULSI (EW)

No. Pendaftaran: LRMP. R1/6509

Didaftarkan oleh:

Bayer CropScience
(Malaysia) Sdn Bhd (7563 M)
12th Floor, Wisma Damansara, Jalan Semantan,
50490 Kuala Lumpur. Tel: 03-2723 0888



Bayer CropScience

BERACUN
JAUHKAN DARIPADA
MAKANAN DAN
KANAK-KANAK

KELAS II

Folicur®

Sila baca dan patuhi arahan label.



Tarikh Mengilang:

Didaftarkan oleh:
Bayer CropScience (Malaysia) Sdn Bhd (7563 M)
 12th Floor, Wisma Damansara, Jalan Semantan, 50490 Kuala Lumpur.
 Tel: 03-2723 0888

Folicur 是来自 Azole 类且具广泛功效的杀菌剂。Folicur有效控制以下的病害:

一般使用法:

农作物	病害	用药量		每公顷 喷液量	每季最高 施喷次数
		10 公升水	每公顷		
菜豆、 龟豆	锈病 (<i>Uromyces vignae</i>)	2.5 毫升	250 毫升	1000 公升	2次
	叶斑病 (<i>Cercospora</i> spp.)				
玉米	锈病 (<i>Puccinia sorghi</i>) 晚疫病 (<i>Helminthosporium maydis</i>)	2.5 毫升	250 毫升	1000 公升	2次
辣椒	炭疽病 (<i>Colletotrichum capsici</i>)	3 毫升	300 毫升	1000 公升	3次
菊花、 玫瑰及 兰花	锈病 (<i>Puccinia horiana</i>)	5 毫升或 4 毫升 Folicur + 2 克 Flint	500 毫升或 400 毫升 Folicur + 200 克 Flint	1000 公升	-
番茄	早疫病 (<i>Alternaria solani</i>)	5 毫升	500 毫升	1000 公升	3次
	白粉病 (<i>Erysiphe polygoni</i>)	3 毫升	300 毫升		

农作物	病害	用药量		每公顷 喷液量	每季最高 喷次数
		10公升水	每公顷		
稻米	稻胡麻叶枯病 (<i>Helminthosporium oryzae</i>)	8 毫升	400 毫升	500 公升	1次
	稻纹枯病 (<i>Rhizoctonia solani</i>)				


最后一次喷射此药剂后,至少 3 天内不可采收菜豆和龟豆,辣椒及番茄;玉米及稻米则是 7 天。

在采收菜豆,龟豆,辣椒及番茄期间,勿施用此农药。

混合指示: 推荐使用手摇背式喷射器。将喷射器装入半桶清水后,即加入推荐用剂量的 Folicur 搅拌。然后添满清水,再搅拌均匀。勿施用高过推荐的施用量。

施喷指示: 当病害侵袭征兆呈现时,即开始施喷。将叶子喷至湿透,以取得良好的控制效能。如有必要,7天重复施喷一次。用 Folicur 与别类具运作方式不同但合用的杀菌剂交替使用。

禁止重进入施喷区的时间为: 24小时



锈病 (*Uromyces vignae*) 叶斑病 (*Cercospora* spp.) 锈病 (*Puccinia sorghi*) 晚疫病 (*Helminthosporium maydis*) 炭疽病 (*Colletotrichum capsici*) 锈病 (*Puccinia horiana*) 锈病 (*Alternaria solani*) 锈病 (*Erysiphe polygoni*)

有毒品
 勿貯藏在靠近食品或
 兒童所接觸的地方

POISONOUS
 KEEP AWAY FROM
 FOODSTUFF AND
 CHILDREN

நஞ்சு
 உணவுகள் மற்றும் குழந்தை
 களுக்கு அருகில் வைக்காதீர்

有毒品
 勿貯藏在靠近食品或
 兒童所接觸的地方

POISONOUS
 KEEP AWAY FROM
 FOODSTUFF AND
 CHILDREN

KELAS II


BERACUN
 JAUHKAN DARIPADA
 MAKANAN DAN
 KANAK-KANAK

நஞ்சு
 உணவுகள் மற்றும் குழந்தை
 களுக்கு அருகில் வைக்காதீர்

Folicur ialah racun kulat kumpulan azole yang berspektrum luas yang mempunyai kesan mengawal dan merawat kulat seperti tercatat dalam jadual:

ATURAN MENGGUNAKANNYA:

Tanaman	Penyakit	Kadar racun		Isipadu Semburan Sehektar	Bilangan Semburan Maksimum Semusim
		10 liter air	sehektar		
Kacang panjang, Kacang buncis	Karat (<i>Uromyces vignae</i>)	2.5 ml	250 ml	1000 liter	2 kali
	Bintik daun (<i>Cercospora</i> spp.)				
Jagung	Karat (<i>Puccinia sorghi</i>) Hawar daun (<i>Helminthosporium maydis</i>)	2.5 ml	250 ml	1000 liter	2 kali
Cili	Antraknos (<i>Colletotrichum capsici</i>)	3 ml	300 ml	1000 liter	3 kali
Bunga kekwa, rose dan orkid	Karat daun (<i>Puccinia horiana</i>)	5 ml atau 4 ml Folicur + 2 g Flint	500 ml atau 400 ml Folicur + 200 g Flint	1000 liter	-
Tomato	Hawar Alternaria (<i>Alternaria solani</i>)	5 ml	500 ml	1000 liter	3 kali
	Kulapuk debu (<i>Erysiphe polygoni</i>)	3 ml	300 ml		
Padi	Hawar daun (<i>Helminthosporium oryzae</i>)	8 ml	400 ml	500 liter	1 kali
	Hawar seludang (<i>Rhizoctonia solani</i>)				



Karat (*Uromyces vignae*) Bintik daun (*Cercospora* spp.) Karat (*Puccinia sorghi*) Hawar daun (*Helminthosporium maydis*) Antraknos (*Colletotrichum capsici*) Karat daun (*Puccinia horiana*) Hawar Alternaria (*Alternaria solani*) Kulapuk debu (*Erysiphe polygoni*)

有毒品
 勿貯藏在靠近食品或
 兒童所接觸的地方

POISONOUS
 KEEP AWAY FROM
 FOODSTUFF AND
 CHILDREN

KELAS II

BERACUN
 JAUHKAN DARIPADA
 MAKANAN DAN
 KANAK-KANAK

நஞ்சு
 உணவுகள் மற்றும் குழந்தை
 களுக்கு அருகில் வைக்காதீர்

Jangan kutip hasil tanaman sekurang-kurangnya 3 hari selepas semburan terakhir bagi kacang panjang dan kacang buncis, cili dan tomato dan 7 hari bagi jagung dan padi.

Tidak boleh digunakan pada peringkat mengutip hasil bagi tanaman kacang panjang, kacang buncis, cili dan tomato.

Panduan Membancuh: Disyorkan menggunakan alat penyembur gelas. Isikan tangki setengah penuh dengan air bersih. Campurkan Folicur secukupnya mengikut syor yang ditetapkan dalam jadual sukatan dan bancuh. Seterusnya tambah baki air bersih yang diperlukan dan kacau. Jangan guna pada kadar yang lebih tinggi dari yang disyorkan.

Panduan Menyembur: Lakukan semburan apabila tanda-tanda penyakit mula kelihatan. Untuk kawalan yang baik, sembur secara menyeluruh ke atas daun. Ulangi semburan selang 7 hari sekali apabila perlu sahaja. Jika rawatan perlu diulangi gunakan Folicur berselang seli dengan racun kulat lain yang mempunyai cara tindakan yang berbeza.

Tempoh Dilarang Masuk Semula Kawasan Rawatan (REI) : 24 jam

TANDA TERKENA RACUN: Mual, perasan tegang, pening.

RAWATAN KECEMASAN: Tanggalkan pakaian yang terkena racun. Jika terkena pada kulit, basuh dengan menggunakan sabun dan air. Jika terkena pada mata, bersihkan dengan menggunakan air bersih yang banyak. Jika tertelan, ikhtiarikan supaya pesakit itu muntah dengan menjolok jari ke dalam kerongkong selepas diberi minum air. Jangan beri apa-apa melalui mulut dan jangan ikhtiarikan pesakit itu muntah jika dia tidak sedar. Dapatkan rawatan perubatan dengan segera.

RAWATAN PERUBATAN: Rawatan hendaklah mengikut tanda sakit.

MEDICAL TREATMENT: Treatment is symptomatic.